高效液相色谱法同时测定蒙药复方述达格-4 中 6 个成分的含量*

信莎莎¹, 杜银飞¹, 董玉^{1**}, 孙国园², 朱小玲², 周昊霏¹, 盛华¹, 胡密霞¹

(1. 内蒙古医科大学药学院, 呼和浩特市 010110; 2. 内蒙古自治区国际蒙医医院, 呼和浩特 010020)

摘要 目的: 建立采用 HPLC 同时测定蒙药复方述达格-4 中 1-苯基-7-(3-甲氧基-4-羟基)苯基-5-醇-3-庚酮、高良姜素、山柰素、高良姜素-3-甲醚、 α -细辛醚、木香炔内酯含量的方法。**方法:** 采用 C₁₈ 色谱柱 (4.6 mm × 250 mm, 5 μ m), 以乙腈-0.2% 乙酸水溶液为流动相, 梯度洗脱, 流速 0.6 mL · min⁻¹, 检测波长 254 nm, 柱温 30 $^{\circ}$ C, 进样量为 10 μ L。**结果:** 1-苯基-7-(3-甲氧基-4-羟基)苯基-5-醇-3-庚酮、高良姜素、山柰素、高良姜素-3-甲醚、 α -细辛醚、木香炔内酯的进样量与其峰面积具有良好的线性关系 ($r=0.9999$); 平均加样回收率 ($n=6$) 为 96.6%~101.1%, RSD 为 0.70%~1.8%; 测定样品 6 批, 1-苯基-7-(3-甲氧基-4-羟基)苯基-5-醇-3-庚酮、高良姜素、山柰素、高良姜素-3-甲醚、 α -细辛醚、木香炔内酯的平均含量分别为 0.008 4%~0.060 0%、0.010 7%~0.061 6%、0.010 9%~0.086 5%、0.006 2%~0.066 6%、0.011 0%~0.078 1%、0.005 1%~0.060 6%。**结论:** 该方法可用于蒙药复方述达格-4 的质量控制, 可为蒙药复方述达格-4 资源开发利用提供理论依据。

关键词: 蒙药复方述达格-4; 菖蒲四味; 民族药; 1-苯基-7-(3-甲氧基-4-羟基)苯基-5-醇-3-庚酮; 高良姜素; 山柰素; 高良姜素-3-甲醚; α -细辛醚; 木香炔内酯; 高效液相色谱

中图分类号: R 917

文献标识码: A

文章编号: 0254-1793(2018)10-1817-07

doi: 10.16155/j.0254-1793.2018.10.23

Simultaneous determination of six components in Mongolian medicine compound formula Shudage-4 by HPLC*

XIN Sha-sha¹, DU Yin-fei¹, DONG Yu^{1**}, SUN Guo-yuan², ZHU Xiao-ling²,
ZHOU Hao-fei¹, SHENG Hua¹, HU Mi-xia¹

(1. College of Pharmacy, Inner Mongolia Medical University, Hohhot 010110, China;

2. Department of Pharmacy, Inner Mongolia International Mongolian Hospital, Hohhot 010020, China)

Abstract Objective: To establish a method for simultaneous determination of 6 components including 1-phenyl-7-(3-methoxy-4-hydroxy)phenyl-5-ol-3-heptanone, galangin, kaempferide, galangin-3-methylether, alpha-asarone and costunolide in Mongolian medicine compound formula Shudage-4 by HPLC. **Methods:** Separation was performed on a C₁₈ column (4.6 mm × 250 mm, 5 μ m) and the mobile phase consisted of acetonitrile-0.2% glacial

* 2016 年内蒙古自治区科技创新引导奖励基金; 2015 年内蒙古自治区科技计划项目 (kj15sf20); 内蒙古自治区高等学校“青年科技英才支持计划”青年科技领军人才 (NJYT-14-A12)

** 通信作者 Tel: (0471) 6653084; E-mail: dongyu010@126.com

第一作者 Tel: 18047108421; E-mail: nmgxss@163.com

acetic acid with gradient elution at a flow rate of $0.6 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$. The detection wavelength was 254 nm and the column temperature was $30 \text{ }^\circ\text{C}$. The injection volume was $10 \text{ } \mu\text{L}$. **Results:** 1-phenyl-7-(3-methoxy-4-hydroxy)phenyl-5-ol-3-heptanone, galangin, kaempferide, galangin-3-methylether, alpha-asarone and costunolide exhibited good linear relationship with correlation coefficients of 0.999 9, the recoveries were 96.6%–101.1%, and the RSD were 0.70%–1.8%. The content ranges of the above mentioned components in 6 samples were 0.008 4%–0.060 0%, 0.010 7%–0.061 6%, 0.010 9%–0.086 5%, 0.006 2%–0.066 6%, 0.011 0%–0.078 1% and 0.005 1%–0.060 6%, respectively. **Conclusion:** The method can be applied in quality control of Mongolian medicine compound formula Shudage-4. The study can provide theoretical basis for development and utilization of Mongolian medicine Shudage-4. **Keywords:** Mongolian medicine compound formula Shudage-4; Changpu Siwei; ethnic medicine; 1-phenyl-7-(3-methoxy-4-hydroxy)phenyl-5-ol-3-heptanone; galangin; kaempferide; galangin-3-methylether; alpha-asarone; costunolide; HPLC

蒙药复方述达格-4 收载于《中华人民共和国卫生部药品标准 蒙药分册》,是蒙医临床上常用的消喘止痛的传统蒙药配方,又名菖蒲四味,由高良姜、紫硃砂、木香、石菖蒲(4:2:1:1)组成,具有镇“巴达干赫依”,消喘止痛的功效。用于隔肌痉挛,胸闷气短,胸肋刺痛,消化不良^[1]。

课题组前期对蒙药复方述达格-4 的总类成分、单成分、双成分及三成分的含量以及药理药效做了相关研究^[2-7],本文建立了以 1-苯基-7-(3-甲氧基-4-羟基)苯基-5-醇-3-庚酮、高良姜素、山柰素、高良姜素-3-甲醚、 α -细辛醚、木香烃内酯为指标的 HPLC 测定方法,该方法简便、准确、快捷,提升了蒙药复方述达格-4 的质量标准,为全面的质量控制提供技术保障。

1 仪器与材料

Agilent 1260 型高效液相色谱仪,包括 DEACB06007 梯度泵、DEAAC21236 自动进样器、DEAAX04861 检测器、JPAAJ82372 柱温箱、DEACN22944 化学工作站(Agilent 公司); AB135-S 型超声清洗仪(昆山市超声仪器有限公司); BS224S 型电子分析天平(北京塞多利斯仪器系统公司); AB-8 大孔吸附树脂(南开化工)。

对照品:高良姜素(批号 111699-200501)、山柰素(批号 110861-200808)、 α -细辛醚(批号 100298-201203)、木香烃内酯(批号 111524-201509),均购自中国食品药品检定研究院。1-苯基-7-(3-甲氧基-4-羟基)苯基-5-醇-3-庚酮、高良姜素-3-甲醚由本课题组从复方述达格-4 中分离、纯化得到,经 UV、 $^1\text{H-NMR}$ 、 $^{13}\text{C-NMR}$ 、MS 分析鉴定结构,经 1260

型 HPLC 仪二极管阵列(DAD)检测器进行峰纯度检测,纯度分别为 99.98%、99.99%,用峰面积归一化法计算纯度分别为 99.74%、99.78%;甲醇、乙腈为色谱纯,其他试剂均为分析纯,水为娃哈哈纯净水。

蒙药复方述达格-4 中各味药材,购于内蒙古天立药材有限公司,所购药材经内蒙古医科大学药学院李骁副教授鉴定,高良姜为姜科植物高良姜(*Alpinia officinarum* Hance)的干燥根茎(批号 20150410),紫硃砂为卤化类矿物红盐(*Halitum violaceum*)的块状结晶体(批号 20150301);木香为菊科植物木香(*Aucklandia lappa* Decne.)的干燥根(批号 20150821);石菖蒲为天南星科菖蒲属多年生草本植物石菖蒲(*Acorus tatarinowii* Schott)的干燥根(批号 20150401)。

2 方法与结果

2.1 溶液的制备

2.1.1 混合对照品溶液 精密称取高良姜素-3-甲醚对照品 5.60 mg,置于 10 mL 量瓶中,加甲醇定容,摇匀,制成每 1 mL 含高良姜素-3-甲醚 0.56 mg 的储备液;精密称取 α -细辛醚对照品 2.10 mg,置于 10 mL 量瓶中,加甲醇定容,摇匀,制成每 1 mL 含 α -细辛醚 0.21 mg 的储备液;精密称取 1-苯基-7-(3-甲氧基-4-羟基)苯基-5-醇-3-庚酮对照品 1.81 mg,高良姜素对照品 3.08 mg,山柰素对照品 1.79 mg,木香烃内酯对照品 4.53 mg,置同一 10 mL 量瓶中,并加入上述高良姜素-3-甲醚储备液及 α -细辛醚储备液各 1 mL,加甲醇定容,摇匀,制成 1-苯基-7-(3-甲氧基-4-羟基)苯基-5-

醇-3-庚酮、高良姜素、山柰素、高良姜素-3-甲醚、 α -细辛醚、木香烃内酯质量浓度分别为 0.181、0.308、0.179、0.056、0.021、0.453 $\text{mg} \cdot \text{mL}^{-1}$ 的溶液，用 0.45 μm 微孔滤膜滤过，即得混合对照品溶液，4 $^{\circ}\text{C}$ 冰箱放置，备用。

2.1.2 供试品溶液 取蒙药复方述达格-4 样品 5.0 g，精密称定，置于 100 mL 圆底烧瓶中，用 10 倍量 50% 乙醇回流提取 2 次，每次 2 h，趁热用棉花粗滤，合并滤液，减压浓缩至无醇味，定容至 10 mL 量瓶中，将上述药液经已处理的 AB-8 大孔吸附树脂柱，依次用蒸馏水及 50% 乙醇洗脱，分别回收溶剂，50% 乙醇部位溶液置于 10 mL 量瓶中，甲醇定容，摇匀，经 0.45 μm 微孔滤膜滤过，取续滤液，即得。

2.1.3 阴性样品溶液 取缺高良姜阴性样品、缺木香阴性样品及缺石菖蒲阴性样品，按“2.1.2”项下方法操作，制得 3 个阴性样品溶液。

2.2 色谱条件

采用 Agilent C_{18} 色谱柱 (4.6 mm $\times$ 250 mm, 5 μm)，以乙腈 (A)-0.2% 乙酸水 (B) 为流动相，梯度洗脱 (0~2 min, 15%A $\rightarrow$ 20%A; 2~5 min, 20%A $\rightarrow$ 25%A; 5~20 min, 25%A $\rightarrow$ 40%A; 20~40 min, 40%A; 40~45 min, 40%A $\rightarrow$ 42%A; 45~55 min, 42%A $\rightarrow$ 47%A; 55~65 min, 47%A $\rightarrow$ 60%A; 65~90 min, 60%A-100%A)，流速 0.6 $\text{mL} \cdot \text{min}^{-1}$ ，检测波长 254 nm，柱温 30 $^{\circ}\text{C}$ ，进样量 10 μL 。在上述色谱条件下各成分基线分离良好，分离度 >1.5 ，详见图 1。

1. 1-苯基-7-(3-甲氧基-4-羟基)苯基-5-醇-3-庚酮 (1-phenyl-7-(3-methoxy-4-hydroxy)phenyl-5-ol-3-heptanone) 2. 高良姜素 (galangin)
3. 山柰素 (kaempferide) 4. 高良姜素-3-甲醚 (galangin-3-methylether) 5. α -细辛醚 (alpha-asarone) 6. 木香烃内酯 (costunolide)

A. 蒙药复方述达格-4 供试品 (test sample of Mongolian Medicine compound formula Shudage-4) B. 混合对照品 (mixed reference substances) C. 缺高良姜阴性样品 (negative sample without *Alpiniae Officinarum* Rhizoma) D. 缺木香阴性样品 (negative sample without *Aucklandiae Radix*) E. 缺石菖蒲阴性样品 (negative sample without *Acori Tatarinowii* Rhizoma)

图 1 高效液相色谱图

Fig. 1 HPLC chromatograms

2.3 线性关系考察

分别精密量取混合对照品溶液 2、4、6、8、10、20 μL , 按“2.2”项下色谱条件进样测定, 记录峰面积。

以待测成分进样量 X (μg) 为横坐标, 峰面积 Y 为纵坐标绘制标准曲线, 计算回归方程、相关系数和线性范围, 结果见表 1。

表 1 回归方程、相关系数和线性范围

Tab. 1 Regression equations, correlation coefficients and linear ranges of 6 chemical compounds

成分 (component)	回归方程 (regression equation)	相关系数 (correlation coefficient)	线性范围 (linear range) / μg
1- 苯基 -7-(3- 甲氧基 -4- 羟基) 苯基 -5- 醇 -3- 庚酮 (1-phenyl-7-(3-methoxy-4-hydroxy)phenyl-5-ol-3-heptanone)	$Y=150.20X-1.56$	0.999 9	0.362~3.62
高良姜素 (galangin)	$Y=5\ 176.37X-59.58$	0.999 9	0.616~6.16
山柰素 (kaempferide)	$Y=4\ 774.00X-60.55$	0.999 9	0.358~3.58
高良姜素 -3- 甲醚 (galangin-3-methylether)	$Y=4\ 192.87X-5.35$	0.999 9	0.109 6~1.096
α - 细辛醚 (alpha-asarone)	$Y=2\ 776.00X-2.59$	0.999 9	0.042~0.42
木香烃内酯 (costunolide)	$Y=426.00X-1.28$	0.999 9	0.604~6.04

2.4 精密度试验

取同一混合对照品溶液, 按“2.2”项下色谱条件, 连续进样 6 次, 测得 1- 苯基 -7-(3- 甲氧基 -4- 羟基) 苯基 -5- 醇 -3- 庚酮、高良姜素、山柰素、高良姜素 -3- 甲醚、 α - 细辛醚、木香烃内酯峰面积的 RSD ($n=6$) 分别为 0.84%、1.1%、0.66%、0.26%、0.25%、0.93%, 表明仪器精密度良好。

2.5 稳定性试验

取同一份供试品溶液, 按“2.2”项下色谱条件, 分别于 0、2、6、4、8、10、12、24 h 进样, 测得 1- 苯基 -7-(3- 甲氧基 -4- 羟基) 苯基 -5- 醇 -3- 庚酮、高良姜素、山柰素、高良姜素 -3- 甲醚、 α - 细辛醚、木香烃内酯峰面积的 RSD ($n=6$) 分别为 0.27%、0.13%、0.13%、0.18%、0.17%、0.46%, 表明供试品溶液在 24 h 内稳定性良好。

2.6 重复性试验

取同一批蒙药复方述达格 -4, 按“2.1.2”项下方法平行制备 6 份供试品溶液, 按“2.2”项下色谱条件分别进样分析, 测得 1- 苯基 -7-(3- 甲氧基 -4- 羟基) 苯基 -5- 醇 -3- 庚酮、高良姜素、山柰素、高良姜素 -3- 甲醚、 α - 细辛醚、木香烃内酯的平均含量分别为 0.041 0%、0.060 0%、0.016 5%、0.014 6%、0.008 4%、0.054 7%, RSD 分别为 0.95%、0.35%、1.2%、1.0%、0.94%、0.50%, 符合方法学验证要求, 表明该方法重复性良好。

2.7 加样回收率试验

取已知含量的同一批次的蒙药复方述达格 -4 约 2.5 g, 共 6 份, 分别加入对照品适量, 按“2.1.2”项下方法制备供试溶液, 按“2.2”项下的色谱条件进行含量测定, 计算 6 个成分的平均回收率及 RSD, 结果见表 2。6 个待测成分的平均回收率分别为 97.1%、97.4%、96.8%、101.1%、96.6%、98.1%, RSD 均小于 2.0%, 表明方法的准确度良好。

2.8 样品的测定

取蒙药复方述达格 -4 6 批, 分别按“2.1.2”项下的方法制备供试品溶液, 按“2.2”项下色谱条件进行分析, 通过回归方程计算 1- 苯基 -7-(3- 甲氧基 -4- 羟基) 苯基 -5- 醇 -3- 庚酮、高良姜素、山柰素、高良姜素 -3- 甲醚、 α - 细辛醚、木香烃内酯的含量, 结果见表 3。

3 讨论

3.1 待测成分的药理活性

蒙药复方述达格 -4 主要含有黄酮、内酯、苯丙素、挥发油等化学成分^[8-10], 具有显著的抗炎, 抗胃溃疡, 抗肿瘤, 镇痛的作用^[11-12]。其中高良姜具有抗肿瘤作用, 抗氧化作用, 抗胃肠道出血作用, 抗溃疡作用和胃黏膜保护作用^[13]; α - 细辛醚具有抗癌, 利胆, 抗菌消炎, 抗癫痫, 镇静, 抗惊厥等作用^[14]; 木香烃内酯具有抗肿瘤, 降血糖, 抑制机体对酒精的吸收, 抑制微生物活性, 抗炎等作用^[15]。

表 2 回收率试验结果

Tab. 2 Recoveries

成分 (component)	称样量 (sample amount)/mg	加入量 (added)/mg	测定量 (measured)/mg	回收率 (recovery)/%	平均回收率 (average recovery)/%	RSD/%
1- 苯基 -7-(3- 甲氧基 -4- 羟基) 苯基 -5- 醇 -3- 庚酮 (1-phenyl-7-(3-methoxy-4-hydroxy) phenyl-5-ol-3-heptanone)	2.501 2	1.120 0	2.125 0	98.2	97.1	1.6
	2.500 8	1.120 0	2.138 4	99.4		
	2.501 1	1.120 0	2.093 7	95.4		
	2.501 4	1.120 0	2.097 0	95.7		
	2.500 3	1.120 0	2.103 7	96.3		
	2.500 6	1.120 0	2.117 0	97.5		
高良姜素 (galangin)	2.501 2	1.540 0	3.002 1	97.5	97.4	1.2
	2.500 8	1.540 0	2.967 8	95.3		
	2.501 1	1.540 0	3.012 6	98.2		
	2.501 4	1.540 0	3.003 8	97.6		
	2.500 3	1.540 0	3.022 9	98.9		
	2.500 6	1.540 0	2.995 1	97.1		
山柰素 (kaempferide)	2.501 2	0.430 0	0.827 0	96.4	96.8	0.70
	2.500 8	0.430 0	0.826 0	96.1		
	2.501 1	0.430 0	0.831 3	97.4		
	2.501 4	0.430 0	0.828 4	96.7		
	2.500 3	0.430 0	0.833 2	97.8		
	2.500 6	0.430 0	0.826 6	96.3		
高良姜素 -3- 甲醚 (galangin-3-methylether)	2.501 2	0.420 0	0.784 8	99.9	101.1	1.4
	2.500 8	0.420 0	0.785 8	100.3		
	2.501 1	0.420 0	0.789 4	101.0		
	2.501 4	0.420 0	0.795 4	102.4		
	2.500 3	0.420 0	0.798 8	103.3		
	2.500 6	0.420 0	0.784 7	99.9		
α - 细辛醚 (alpha-asarone)	2.501 2	0.260 0	0.457 8	95.3	96.6	1.8
	2.500 8	0.260 0	0.460 3	96.2		
	2.501 1	0.260 0	0.467 6	99.0		
	2.501 4	0.260 0	0.457 3	95.1		
	2.500 3	0.260 0	0.465 6	98.3		
	2.500 6	0.260 0	0.458 1	95.4		
木香烃内酯 (costunolide)	2.501 2	1.480 0	2.844 1	99.7	98.1	1.4
	2.500 8	1.480 0	2.794 3	96.4		
	2.501 1	1.480 0	2.817 5	97.9		
	2.501 4	1.480 0	2.839 8	99.4		
	2.500 3	1.480 0	2.820 2	98.1		
	2.500 6	1.480 0	2.801 2	96.8		

表 3 不同批次样品的测定结果(%, n=3)

Tab. 3 The determination results of different batches of samples

成分(component)	样品 1 (sample No. 1)	样品 2 (sample No. 2)	样品 3 (sample No. 3)	样品 4 (sample No. 4)	样品 5 (sample No. 5)	样品 6 (sample No. 6)
1-苯基-7-(3-甲氧基-4-羟基)苯基-5-醇-3-庚酮 (1-phenyl-7-(3-methoxy-4-hydroxy)phenyl-5-ol-3-heptanone)	0.041 0	0.043 2	0.068 9	0.028 4	0.055 1	0.034 3
高良姜素(galangin)	0.060 0	0.061 6	0.086 5	0.066 6	0.078 1	0.060 6
山柰素(kaempferide)	0.016 5	0.014 4	0.016 8	0.015 8	0.016 5	0.016 9
高良姜素-3-甲醚 (galangin-3-methylether)	0.014 6	0.015 5	0.019 4	0.012 5	0.014 2	0.013 0
α -细辛醚(alpha-asarone)	0.008 4	0.010 7	0.010 9	0.006 2	0.011 0	0.005 1
木香烃内酯(costunolide)	0.054 7	0.057 1	0.042 7	0.049 4	0.063 4	0.049 3

3.2 测定波长的选择

本实验采用 DAD 检测器在 200~400 nm 波长下进行全波长扫描,并采集光谱图,结果发现 1-苯基-7-(3-甲氧基-4-羟基)苯基-5-醇-3-庚酮、高良姜素、山柰素、高良姜素-3-甲醚和 α -细辛醚在 254 nm 左右有较好的吸收,木香烃内酯在 210 nm 左右有较好的吸收,且在 254 nm 处也有较好的吸收,色谱峰形和分离度良好,基线平整,故选择 254 nm 作为检测波长。

3.3 流动相的选择

本实验试用了甲醇-水、乙腈-水、甲醇-乙酸水、乙腈-乙酸水等不同系统为流动相,分别进行优化与筛选,结果采用甲醇-水、乙腈-水、甲醇-乙酸水为流动相时,无论是等度洗脱,还是梯度洗脱均不能将上述 6 个成分有效分离,而以乙腈-乙酸水溶液系统为流动相时峰形较好,基线稳定,经比较选择最后确定采用乙腈-0.2% 乙酸水溶液为流动相。

3.4 柱温的选择

色谱柱的温度对被分离物质的保留时间及分离度有较大影响^[16]。当温度在 25 °C 以下时高良姜素与山柰素的峰重叠,同时高良姜素-3-甲醚和 α -细辛醚达不到基线分离;温度达到 35 °C 时,木香烃内酯与其他峰不能很好地分离,分离度较差;当温度继续升高时,分离效果更差。因此,在保证每个成分有效分离的前提下,本试验选择在 30 °C 的条件下进行分析测定。

3.5 小结

本实验建立测定蒙药复方述达格-4 中 1-苯基-7-(3-甲氧基-4-羟基)苯基-5-醇-3-庚酮、高良姜素、山柰素、高良姜素-3-甲醚、 α -细辛醚、木香烃内酯 6 个成分含量的方法,精密度高,重复性好,选择性强,干扰较小,适合蒙药复方述达格-4 中上述 6 个成分的含量分析,为此药的质量控制提供依据,为反映蒙药复方多成分、多靶点及协同作用的特性,对全面控制药材质量,建立科学的质量控制方法具有重要的意义。

参考文献

- [1] 中华人民共和国卫生部药品标准 蒙药分册[S].1998: 158
Drug Specifications Promulgated by the Ministry of Public Health, P. R. China. Mongolian Fascicles[S]. 1998: 158
- [2] 贾鑫,董玉,武娜. 紫外可见分光光度法测定蒙药述达格-4 中总黄酮的含量[J]. 内蒙古医学院学报, 2010, 32(3): 303
JIA X, DONG Y, WU N. Determination of total flavones content in Shudage-4 by UV-visible spectrophotometry[J]. J Inner Mongolia Med Coll, 2010, 32(3): 303
- [3] 信莎莎,杜银飞,董玉. 紫外可见分光光度法测定蒙药述达格-4 中苯丙素的含量[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版), 2016, 47(5): 522
XIN SS, DU YF, DONG Y. Determination of phenylpropanoids in Mongolian medicine compound formula Shudage-4 by UV-VIS spectrophotometry[J]. J Inner Mongolian Univ(Nat Sci Ed), 2016, 47(5): 522
- [4] 信莎莎,杨洋,孙国园,等. HPLC 法测定蒙药复方述达格-4 中 1-苯基-7-(3-甲氧基-4-羟基)苯基-5-醇-3-庚酮的含

- 量[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版), 2015, 46(2): 191
XIN SS, YANG Y, SUN GY, *et al.* Quantitative determination of 1-phenyl-7-(3-methoxy-4-hydroxy)phenyl-5-ol-3-heptanone in Mongolian medicine compound formula Shudage-4 by HPLC[J]. J Inner mongolian Univ (Nat Sci Ed), 2015, 46(2): 191
- [5] 马强, 贾鑫, 董玉. RP-HPLC 法测定蒙药复方述达格-4 中高良姜素和山奈素的含量[J]. 北京中医药大学学报, 2010, 33(12): 845
MA Q, JIA X, DONG Y. Quantitative determination of galangin and kaempferide in Shudage-4 (Mongolian medicinal formula) by RP-HPLC[J]. J Beijing Univ Tradit Chin Med, 2010, 33(12): 845
- [6] 信莎莎, 杨洋, 白埔, 等. 蒙药述达格-4 抗小鼠胃溃疡的作用研究[J]. 北京中医药大学学报, 2015, 38(8): 524
XIN SS, YANG Y, BAI P, *et al.* Effects of Mongolian medicine Shudage-4 on gastric ulcer[J]. J Beijing Univ Tradit Chin Med, 2015, 38(8): 524
- [7] 杜银飞, 周昊霏, 信莎莎, 等. 蒙药复方述达格-4 有效部位抗实验性胃溃疡的作用及其机制[J]. 北京中医药大学学报, 2016, 39(10): 839
DU YF, ZHOU HF, XIN SS, *et al.* Effect and mechanism of effective components of Mongolian medicine compound Shudage-4 against experimental stomach ulcer[J]. J Beijing Univ Tradit Chin Med, 2016, 39(10): 839
- [8] 祝永仙, 李尚秀, 赵升逵, 等. 高良姜的化学成分研究[J]. 云南民族大学学报(自然科学版), 2013, 22(4): 239
ZHU YX, LI SX, ZHAO SK, *et al.* Study on chemical constituents of *Alpinia officinarum* Hance [J]. J Yunnan Univ Natl (Nat Sci Ed), 2013, 22(4): 239
- [9] 董玉, 石任兵, 刘斌. 石菖蒲化学成分的研究(I)[J]. 北京中医药大学学报, 2007, 30(1): 61
DONG Y, SHI RB, LIU B. Study on chemical compositions of *Acorus tatarinowii* Schott (I) [J]. J Beijing Univ Tradit Chin Med, 2007, 30(1): 61
- [10] 张婷, 马林, 吴丰, 等. 云木香乙醇提取物化学成分研究[J]. 中国中药杂志, 2012, 37(9): 1232
ZHANG T, MA L, WU F, *et al.* Study on chemical constituents of extracts of *Radix Aucklandiae* alcohol cloud [J]. China J Chin Mater Med, 2012, 37(9): 1232
- [11] 曹伟国, 刘志勤, 邵云, 等. 黄酮类化合物药理作用的研究进展[J]. 西北植物学报, 2003, 23(12): 2241
CAO WG, LIU ZQ, SHAO Y, *et al.* Research progress in pharmacological action of flavonoid [J]. J Northwest Plant, 2003, 23(12): 2241
- [12] 张丽娟, 刘继勇, 姚翀, 等. 洋川芎内酯类化合物药理作用研究进展[J]. 中国药学杂志, 2015, 50(13): 1081
ZHANG LJ, LIU JY, YAO C, *et al.* Progress of senkyunolide compounds pharmacological research [J]. Chin Pharm J, 2015, 50(13): 1081
- [13] 李洪福, 李永辉, 王勇, 等. 高良姜化学成分及药理活性的研究[J]. 中国实验方剂学杂志, 2014, 20(7): 236
LI HF, LI YH, WANG Y, *et al.* Advances in studies on chemical constituents in *Alpinia officinarum* Rhizoma and their pharmacological activities [J]. Chin J Exp Tradit Med Form, 2014, 20(7): 236
- [14] 赵李宏, 吴建梅, 武凤兰. α -细辛脑近 10 年研究概述[J]. 中国中药杂志, 2007, 32(7): 562
ZHAO LH, WU JM, WU FL. α -asarone takes nearly 10 years of research [J]. China J Chin Mater Med, 2007, 32(7): 562
- [15] 潘阳, 王小静, 潘娟, 等. 木香烯内酯的药理作用及构效关系研究进展[J]. 中南药学, 2013, 11(2): 108
PAN Y, WANG XJ, PAN J, *et al.* Research progress of pharmacological action and structure-activity relationship of costunolide [J]. Cent Suoth Pharm, 2013, 11(2): 108
- [16] 曹淑瑞, 刘治勇, 张雷, 等. 高效液相色谱法同时测定食品中 6 种对羟基苯甲酸酯[J]. 分析化学, 2012, 40(4): 529
CAO SR, LIU ZY, ZHANG L, *et al.* Simultaneous determination of 6 benzoic acid esters in food by high performance liquid chromatography [J]. Anal Chem, 2012, 40(4): 529

(本文于 2018 年 9 月 5 日修改回)